

FORMATO LC-31	INFORME ANUAL GDCV FASE III	Revisión X
---------------	------------------------------------	------------

En este informe se recogen los datos de un periodo de un año natural.

INDICADORES DE SUJECIONES

Nota:

Personas Cuidadas que serían objeto de sujeción: personas con trastorno mental con agitación, con cuadros de agresividad, con delirio o estado confusional agudo, con otros comportamientos disruptivos, personas de perfil psicogeriatrónico y/o dependientes y/o con deterioro cognitivo (≤ 40 en el Índice de Barthel y/o ≤ 20 en el MEC), personas con problemas posturales, personas con caídas de repetición).

Personas con más de 20 puntos en el MEC la prevalencia de uso de sujeción tendrá que ser de 0%.

INDICADOR	FÓRMULA	REFERENCIA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	RESULTADO	ACCIONES MEJORA
Sujeciones Habituales						
SubIndicadores de Prevalencia de Uso de Sujeción Física						
Prevalencia de Período	(Nº de personas cuidadas con Sujeción Restrictiva Habitual)/(Nº de personas cuidadas	- Niveles de Media o Corta Estancia, <u>de obligado</u>	Equipo Médico y Comité No Sujeción	La organización o nivel asistencial registrará la prevalencia de uso de sujeción restrictiva		

	<p>que en el nivel asistencial o de intervención concreto serían objeto de sujeción) x 100 en <u>un determinado período de tiempo</u> (Semanal, Mensual, Anual, Bianual...).</p>	<p><u>cumplimiento:</u> <5 y tendente a 0.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niveles de Larga Estancia y Cuidado en Domicilio: <5 y tendente a 0. 		<p>mensualmente para de ese modo, obtener una media de uso anual.</p>		
Prevalencia Puntual	<p>(Nº de personas cuidadas con Sujeción Restrictiva Habitual)/(Nº de personas cuidadas que en el nivel asistencial o de intervención concreto serían objeto de sujeción) x 100 <u>en un momento</u>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Niveles de Larga Estancia y Cuidado en Domicilio (en el momento de la Evaluación): <5 y tendente a 0. - Niveles de Media o Corta Estancia: (en el momento de la Evaluación): <5 y tendente a 0. Si la organización no ha alcanzado este 	Equipo Médico y Comité No Sujeción	<p>La organización o nivel asistencial registrará el porcentaje de uso de sujeción restrictiva en el momento de la Evaluación Externa.</p>	<p>Indicar % en relación al total de personas usuarias:</p> <p>El % sobre las personas susceptibles de ser sujetadas se extraerá del APUS:</p>	

		<p>subindicador, <u>podrá sustituirlo</u> por mostrar evidencias de evolución favorable y mejora en el alcance de todos los Subindicadores Guía entre dos períodos de tiempo diferentes en un intervalo de 1 o 2 años.</p>					
Sujeciones Episódicas							
SubIndicadores de Prevalencia de Uso de Sujeción Física							
Prevalencia de Período	(Nº de personas cuidadas con Sujeción Restrictiva Episódica/Nº de personas cuidadas que en el nivel asistencial o de intervención concreto serían objeto de sujeción) x 100 en un	Niveles Asistenciales donde más del 70% de las personas en él atendidas presentan riesgo de padecer episodios de carácter psiquiátrico o psicogeriátrico agudos: <u>de obligado cumplimiento: <5</u> y	Equipo Médico y Comité No Sujeción	No	Frecuencia con la que se reúna el Equipo Médico y el Comité No Sujeción para valoración.		

	<u>determinado período de tiempo</u> (Semanal, Mensual, Anual, Bianual...).	tendente a 0. Resto de Niveles Asistenciales: <5 y tendente a 0.				
Prevalencia Puntual	(Nº de personas cuidadas con Sujeción Restrictiva Episódica/Nº de personas cuidadas que en el nivel asistencial o de intervención concreto serían objeto de sujeción) x 100 <u>en un determinado momento</u> .	Niveles Asistenciales donde más del 70% de las personas en él atendidas presentan riesgo de padecer episodios de carácter psiquiátrico o psicogerátrico agudos: <u>de obligado cumplimiento</u> : <5 y tendente a 0. Si la organización no ha alcanzado este subíndicador, <u>podrá sustituirlo</u> por mostrar evidencias de evolución favorable y mejora en el alcance de todos los Subíndicadores Guía	Equipo Médico y Comité Sujeción	No	La organización o nivel asistencial registrará el porcentaje de uso de sujeción restrictiva en el momento de la Evaluación Externa.	

		entre dos períodos de tiempo diferentes en un intervalo de 1 o 2 años. Resto de Niveles Asistenciales: <5 y tendente a 0.				
INDICADOR	FÓRMULA	REFERENCIA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	RESULTADO	ACCIONES MEJORA
Porcentaje de Consecuencias Asociadas al uso de sujeciones restrictivas habituales (FORMATO LC-7.01 LISTADO DE LISTADOS)	(Nº personas cuidadas con Consecuencias Asociadas al Uso de Sujeciones Habituales)/(Nº personas cuidadas con Sujeciones Habituales) x 100	0%	Equipo Médico			
Porcentaje de Consecuencias Asociadas al uso de sujeciones	(Nº personas cuidadas con Consecuencias Asociadas al Uso de Sujeciones Episódicas)/(Nº	0%	Equipo Médico			

restrictivas episódicas (FORMATO LC-7.01 LISTADO DE LISTADOS)	personas cuidadas con Sujeciones Episódicas) x 100					
Nº muertes producidas entre personas con uso de sujeciones restrictivas habituales (% fallecimientos entre personas con sujetaciones habituales)	(Nº personas cuidadas Fallecidas a Consecuencia del Uso de Sujeciones Habituales)/(Nº Total de personas cuidadas con Sujeciones Habituales) x 100	0%	Equipo Médico			
Nº muertes producidas entre personas con uso de sujeciones restrictivas episódicas (% fallecimientos	(Nº personas cuidadas Fallecidas a Consecuencia del Uso de Sujeciones Episódicas)/(Nº Total de personas cuidadas con Sujeciones Episódicas) x 100	0%	Equipo Médico			

entre personas con sujeciones episódicas)						
Nº muertes producidas por el uso de sujetaciones restrictivas habituales (% muertes cuya causa son las sujetaciones habituales)	(Nº personas cuidadas Fallecidas a Consecuencia del Uso de Sujeciones Habituales)/(Nº Total de personas cuidadas Fallecidas) x 100	0%	Equipo Médico			
Nº muertes producidas por el uso de sujetaciones restrictivas episódicas (% muertes cuya causa son las sujetaciones episódicas)	(Nº personas cuidadas Fallecidas a Consecuencia del Uso de Sujeciones Episódicas)/(Nº Total de personas cuidadas Fallecidas) x 100	0%	Equipo Médico			
	Niveles asistenciales o de intervención					

Uso de Psicótropos (Fundamentalmente Neurolépticos y Benzodiacepinas) en Cuadros Crónicos	Porcentaje de Psicótropos/Total de personas cuidadas independientes y con grados de dependencia leve a moderada. Según escala Barthel.	(centros, módulos o servicios) con pacientes o personas cuidadas con independencia y con grados de dependencia de leve a moderada: Porcentaje de uso no superior a un 25% del total de éstas	Equipo Médico. Se pretende saber el porcentaje de personas usuarias o pacientes que tiene pautados psicótropos.			
Uso de Psicótropos (Fundamentalmente Neurolépticos y Benzodiacepinas) en Cuadros Crónicos	Porcentaje de Psicótropos/Total de personas cuidadas con grados de dependencia o discapacidad grave, total y personas cuidadas con patología psiquiátrica o psicogeriátrica.	Niveles asistenciales o de intervención (centros, módulos o servicios) con pacientes o personas cuidadas con grado de dependencia, grave, total o con patología psiquiátrica o psicogeriátrica: Porcentaje de uso no superior a un 50% del total de éstas	Equipo Médico. Se pretende saber el porcentaje de personas usuarias o pacientes que tienen pautados psicótropos			

